

BHZPlaktiv

NEUES vom Schwein – Ihr Lösungsanbieter für verantwortungsvolle Schweineproduktion.

Sau solide.

Fütterung Mastschweine vom db.77®

db.77®



Hohe tägliche Zunahmen und ein hoher Magerfleischanteil schließen einander nicht aus. Dafür muss eine bedarfsgerechte Versorgung mit Nährstoffen sichergestellt und die Futterzuteilung dem Wachstumsverlauf der Tiere angepasst werden. Die folgende Tabelle enthält eine mögliche Futterkurve auf Basis eines Zunahmenniveaus von 950 Gramm Tageszunahmen.

Eine betriebsindividuelle Anpassung dieser Futterkurve ist jedoch notwendig. Sprechen Sie unsere Außendienstmitarbeiter an.

Die Nachkommen des Ebers db.77® (BHZP Piétrain, NN) können durchgehend ad libitum gefüttert werden. Die Anzahl und Ausgestaltung der Fress- und Tränkestellen sollte es den Tieren leicht machen, an Futter und Wasser zu gelangen. Bei sehr hohen Wachstumsintensitäten kann es allerdings sinnvoll sein, zumindest die Börgе in der Endmast restriktiv zu versorgen. An die optimale Futterrestriktion sollte man sich schrittweise, betriebsindividuell (!) herantasten. Generell gilt: Übergänge zur restriktiven Versorgung müssen gleitend vorgenommen werden und können ab 90 bis 95 kg eingeleitet werden.


Futterkurve für db.77® Nachkommen ca. 950 Gramm tägliche Zunahme

Mast Woche	Gewicht (kg)		Futterangebot MJ ME / Tier / Tag	
	von	bis	weiblich	Börgе
1	27	32,5	20	22
2	32,5	38,1	22	24
3	38,1	44,1	24	26
4	44,1	50,6	26	29
5	50,6	57,6	28	33
6	57,6	65	30	36
7	65	72,8	33	38
8	72,8	80,6	36	38
9	80,6	88	38	38
10	88	95,1	39	39
11	95,1	102	39	39
12	102	108,3	39	39
13	108,3	114,3	39	39
14	114,3	120	39	39

Futterverwertung 1 zu 2,63

Fütterung Mastschweine vom db.77®

Mehrphasige Fütterung: Vorschlag für die Nährstoffgehalte von Mischfuttern für db.Masttiere



		Ferkelaufzucht ¹ FAZ II	Vormast ¹	Mittelmast ¹	Endmast ¹	4. Phase ¹
Gewicht	(kg)	bis max. 35	28 – 55	55 – 85	ab 85	> 95
Energie	(MJ ME)	13,2 – 13,6	13,2 – 13,6	13,2 – 13,6	13,0 – 13,2	13,2
Rohprotein	(%)	17,0 – 17,5	15,5 – 17,0	15,0 – 15,5	13,5 – 14,0	13,0
Rohfett	(%)	max. 5,5	max. 4,0 – 4,5	max. 4,5 – 5,0	max. 4,0	max. 4,0
Rohfaser	(%)	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Stärke	(%)	–	40	40	40	40
Lysin ²	(%)	1,20 – 1,25	1,13 – 1,16	1,00 – 1,02	0,92 – 0,93	0,90
g Lysin / MJ ME		0,91 – 0,92	0,85 – 0,86	0,75 – 0,76	0,70 – 0,71	0,68
g Lysin / 100g RP		7,1	6,8 – 7,3	6,6 – 6,7	6,6 – 6,9	6,9
Met + Cys ³	(%)	0,72 – 0,75	0,68 – 0,70	0,60 – 0,61	0,55 – 0,56	0,54
Threonin	(%)	0,78 – 0,81	0,73 – 0,75	0,65 – 0,66	0,60	0,59
Calcium	(%)	0,75	0,70	0,60	0,55	0,52
Phosphor	(%)	0,50	0,47	0,40	0,35 – 0,40	0,35
Natrium	(%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vitamin A	(I. E.)	16.000	6.500	6.500	5.200	5.200
Vitamin D3	(I. E.)	2.000	2.000	1.000	800	800
Vitamin E	(mg)	120	80	60	40	40
Kupfer ⁴	(mg)	100	15	15	15	15
Phytase	(FTU)	ja	ja	ja	ja	ja
Aminogramm	Lys : Met/Cys : Thr : Try 1 : 0,6 : 0,65 : 0,2					

Inhaltsstoffe bezogen auf 87% T

1) Für eine stark N-/P-reduzierte Fütterung geeignet

2) Die Aminosäureausstattung sollte sich am Energiegehalt orientieren.

3) Mindestens 50% müssen durch Methionin abgedeckt sein

4) Gesamtkupfergehalt im Futtermittel