

Fütterung Mastschweine von db.Siegfried

Die Nachkommen von db.Siegfried besitzen ein enormes Wachstumspotenzial, gepaart mit einem hohen Futteraufnahmevermögen.

Um das Fleischbildungsvermögen der Duroc-Tiere optimal auszunutzen und einen hohen Magerfleischanteil zu generieren, sollten folgende Grundregeln beachtet werden:

🐷 Eine hochwertige Versorgung der Tiere in der Eingewöhnung und Vormast, um das Fleischbildungsvermögen junger Tiere optimal auszunutzen.

Bei der Auswahl der Futtermittel ist auf hochwertige Eiweiß- und Faserträger zu achten. Eine ausreichende Aminosäurenversorgung ist hier besonders wichtig.

Zurückbleibende Tiere evtl. absortieren und länger hochwertig versorgen.

🐷 Hohe biologische Leistungen führen auch zu hohen Stoffwechselaktivitäten. Daher ist eine Anpassung des Klimas zu empfehlen (ggf. Umgebungstemperaturen etwas absenken). Auf das Liegeverhalten der Tiere achten.

🐷 Im Endmastbereich (ab ca. 80–85 kg Lebendgewicht) versuchen, die Tiere schrittweise zu rationieren. Auf hochwertige Faserträger achten.

🐷 Vermarktungs- und Sortierungsstrategien sollten auf die Nachkommen von db.Siegfried abgestimmt werden.



Futterkurve für db.Siegfried Nachkommen

ca. 1.000 Gramm tägliche Zunahme

Mast Woche	Gewicht (kg)		Futterangebot MJ ME / Tier / Tag
	von ~	bis ~	
1	28	34,3	25
2	34,3	40,9	27
3	40,9	47,7	29
4	47,7	54,6	31
5	54,6	61,8	33
6	61,8	69,7	36
7	69,7	77,5	37
8	77,5	85,1	37
9	85,1	92,3	38
10	92,3	99,4	38
11	99,4	106,1	38
12	106,1	112,6	38
13	112,6	118,9	38
14	118,9	125,0	38

Futterverwertung 1 zu 2,65

Fütterung Mastschweine von db.Siegfried



Mehrphasige Fütterung:

Vorschlag für die Nährstoffgehalte von Mischfuttern für db.Masttiere

		Ferkelaufzucht ¹ FAZ II	Vormast ¹	Mittelmast ¹	Endmast ¹
Gewicht	(kg)	bis max. 35	28 – 55	55 – 85	ab 85
Energie	(MJ ME)	13,2 – 13,6	13,2	13,2	13,0
Rohprotein	(%)	17,0 – 17,5	15,5	15,0	13,5
Rohfett	(%)	max. 5,5	max. 4,0	max. 4,0	max. 4,0
Rohfaser	(%)	4,5	4,6	4,6	4,6
Stärke	(%)	–	40	40	40
Lysin ²	(%)	1,20 – 1,25	1,16	1,00	0,92
g Lysin / MJ ME		0,91 – 0,92	0,88	0,76	0,71
g Lysin / 100g RP		7,1	7,5	6,7	6,8
Met + Cys ³	(%)	0,72 – 0,75	0,70	0,60	0,55
Threonin	(%)	0,78 – 0,81	0,75	0,65	0,60
Calcium	(%)	0,75	0,70	0,60	0,55
Phosphor	(%)	0,50	0,47	0,40	0,40
Natrium	(%)	0,25	0,25	0,25	0,25
Vitamin A	(I. E.)	16.000	6.500	6.500	5.200
Vitamin D3	(I. E.)	2.000	2.000	1.000	800
Vitamin E	(mg)	120	80	60	40
Kupfer ⁴	(mg)	100	15	15	15
Phytase	(FTU)	ja	ja	ja	ja
Aminogramm	Lys : Met/Cys : Thr : Try 1 : 0,6 : 0,65 : 0,2				

Inhaltsstoffe bezogen auf 87% T

1) Für eine stark N-/P-reduzierte Fütterung geeignet

2) Die Aminosäureausstattung sollte sich am Energiegehalt orientieren.

3) Mindestens 50 % müssen durch Methionin abgedeckt sein

4) Gesamtkupfergehalt im Futtermittel